TULARE COUNTY
HEALTH & HUMAN SERVICES AGENCY

Timothy W. Lutz, MBA
Agency Director

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA: 7 de mayo, 2019

CONTACTO: Tammie Weyker-Adkins, 559-624-8007
EMAIL: TMWeyker@tularehhsa.org

Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Tulare Aumenta la Conciencia sobre el Sarampión

No se han encontrado exposiciones o casos positivos en este momento

VISALIA, CA – Los funcionarios de la División de Salud Pública de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Tulare informan que no se conocen riesgos actuales relacionados con el sarampión en el Condado de Tulare en este momento; sin embargo, los funcionarios se están preparando activamente para el potencial de una exposición o brote. El Laboratorio de Salud Pública del Condado de Tulare ha recibido muestras de Tulare y de los condados circundantes para su análisis: todas las muestras han resultado negativas para el sarampión.

El riesgo de estar expuesto al sarampión aumenta en este momento con brotes en otras áreas", dijo la Dra. Karen Haught, Oficial de Salud Pública del Condado de Tulare. "Viajar, especialmente a lugares que tienen brotes, puede aumentar el riesgo de exposición al sarampión, lo que aumenta la importancia de vacunarse contra el sarampión".

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, con síntomas que incluyen fiebre (más de 101˚), tos, secreción nasal, conjuntivitis (ojos rojos) y una erupción que comienza en la cabeza y se desplaza por el tronco hacia las extremidades inferiores. El virus se transmite por la tos o el estornudo de una persona infectada, y el virus puede vivir dos horas después de que la persona con sarampión haya salido de la habitación. Las personas con sarampión pueden infectar a otras personas desde cuatro días antes hasta cuatro días después de que aparezca la erupción. El período de incubación para el desarrollo del sarampión es de hasta 21 días después de haber sido expuesto.

La mejor manera de prevenir el sarampión es vacunarse contra el sarampión, está disponible en el consultorio de su médico, en la farmacia local o en la clínica de salud. La División de Salud Pública tiene un programa de inmunización que ofrece inmunizaciones de bajo costo o sin costo para las personas que no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente. Para obtener más información, llame al (559) 685-5725 o visite https://tchhsa.org/eng/index.cfm/public-health/immunizations/ para ver el calendario de vacunación, las recomendaciones de viaje y los requisitos escolares de mayo de 2019.

Los niños usualmente reciben su primera vacuna contra el sarampión entre un año y 15 meses de edad, con una segunda vacuna entre las edades de cuatro y seis años. Un individuo necesita las dos vacunas para estar completamente protegido. La tasa de vacunación del Condado de Tulare para 2017/2018 fue de 98.3% para los niños que ingresan al kindergarten, que incluye dos vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR).

Los viajeros que realicen viajes nacionales o internacionales deben consultar las recomendaciones de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/measles. Para aquellos que planean viajes internacionales, especialmente personas de cualquier edad que no tengan pruebas de inmunidad, asegúrese de estar protegido contra el sarampión. Para obtener más información, visite las recomendaciones de viajes internacionales de los CDC en https://www.cdc.gov/measles/travelers.html.

Si cree que usted o alguien de su familia tiene sarampión o ha estado expuesto, comuníquese con el consultorio de su médico o con una clínica local de inmediato. Dígales que es posible que tenga sarampión antes de ingresar para que puedan evitar la exposición de otros pacientes y el personal.

Para obtener más información, visite https://www.cdc.gov/measles/index.html.

###